EN

fluorecare®

SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen Combo Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)

PRODUCT NAME

Common Name: SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen Combo Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)
PRODUCT CODE: MP-71
PACKING:25 tests/ box

INTENDED USE

The SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen Combo Test Kit is applicable to the simultaneous qualitative detection and differentiation of novel Coronavirus (SARS-CoV-2 Antigen), Influenza A virus, Influenza B virus Antigen nucleo-SARS-CoV-2 Antigen in specimens Oropharyngeal swab, Nasal swab or Nasopharyngeal swab specimens from individuals suspected COVID-19 by its healthcare provider.

INTRODUCTION

The novel coronaviruses belong to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease People are generally susceptible. Currently, the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection. Asymptomatic infected people can also be infectious to some extent. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases. Influenza viruses are usual mild to severe illness. Serious symptoms of the flu can result in hospitalization and death. People at high risk of serious flu complications include young children, older people, individuals with underlying health conditions, and a higher risk for serious flu complications. There are two major types of influenza viruses, types A and B. Both type A and B influenza viruses regularly spread among people and cause seasonal epidemics each winter. Influenza A viruses can be spread to others before and after a person shows signs and symptoms of illness.

Respiratory syncytial virus (RSV) is a enveloped, single-stranded RNA virus with negative-strand envelope, which belongs to the genus of the virus. RSV is the main cause of acute lower respiratory tract infection in infants. Most RSV infection in the world has been reported in children under the age of 2 years old. Typical symptoms of RSV infection are fever, runny nose, cough, and wheezing. Respiratory syncytial virus is usually transmitted by droplet and contact, and the population is generally susceptible. People over 65 ages are susceptible to RSV, but sometimes very infants (especially infants aged 2 to 6 months) are very sensitive to RSV, which often causes serious respiratory diseases such as bronchiolitis and pneumonia.

PRINCIPLE

The SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen is qualitatively detected in population Oropharyngeal swab, Nasal swab or Nasopharyngeal swab using the by the colloidal gold method. After sample added, the SARS-CoV-2 Antigen (or Influenza A/B & RSV) in the sample to be tested is combined with the SARS-CoV-2 Antigen (or Influenza A/B & RSV) antibody-colloidal gold conjugate to form a complex. The mixture then migrates by capillary action and interacts with the SARS-CoV-2 Antigen (or Influenza A/B & RSV) antibody-colloidal gold complex. Then, the chromatography, the SARS-CoV-2 Antigen (or Influenza A/B & RSV) antibody-colloidal gold conjugate will be captured by the SARS-CoV-2 Antigen (or Influenza A/B & RSV) antibody in the test line region. The antibody/antigen or binds to an antibody-coloured entity (red) therefore the area, showing a positive result. Colloidal gold-labelled SARS-CoV-2 Antigen (or influenza A/B & RSV) antibody diffuses to the quality control line (C) region and is captured by rabbit anti-mouse antibodies. When the reaction is over, the results can be interpreted by visual observation.

MAJOR COMPONENTS

Components	Quantity	Major Components
Test Card (Including the desiccant)	25 Cassettes	Each test card is individually composed of a plastic shell and strips. The test card is for use only in control with SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A and Influenza B & RSV antibody coated with colloidal gold. Other components include pad and the dried desiccant pad.
Sample treatment solution	1 tube	Optional (Normal saline solution 5 mL per tube)
Disposable sample treatment solution	5 ml×50tubes	/
Instruction for use	1 Copy	/
Sterile swabs	25 Piece	/
Extraction tube	25 Piece	/
Positive Control	1 tube	Optional: 2x SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A and Influenza B & RSV antibody coated with colloidal gold. 1mL nucleic SARS-CoV-2 protein, Influenza A and Influenza B protein, 0.5% preservative.
Negative Control	1 tube	Optional (1 negative human blood powder, prepared from a sample treatment solution)

NOTE: Accessories required but not provided:

- Timer
- Formaldehyde acid or Virkl Transport Media., there is a need for a plastic transfer pipette (or a reusable sample collected by or other) for sample to transfer the measured volume to the extraction tube.
- The components listed above are for use with the kit of the same batch, and their components in the kit of different batches should not be mixed together.

STORAGE CONDITIONS AND EXPIRY DATE

Store test kit at 2-30°C in dry place. Keep away from direct sun exposure. Do not freeze at 2-8°C. Test kits valid for 24 months from dated manufacture. Do not use pouch is opened, the test kit to be performed within 1 hour.

EQUIREMENTS OF SPECIMENS

1. Sample collection

1.1 Oropharyngeal or nasal collection method

1.1.1 Tip the patient's head slightly.

1.1.2 Use a sterile swab to rub on the oropharynx or nasal the pharyngeal tonsils on either side, being careful not to touch the tongue or gums.

1.1.3 Rub the oropharyngeal tonsils and both sides of the throat at least 2 times.

1.1.4 Rub the posterior pharyngeal wall up and down at least 3 times.

1.1.5 Test the samples as soon as possible.

1.2 Nasopharyngeal swab collection method

1.2.1 Tip the patient's head back and collect sample from the nostril with the flocked swab (nasal should be inclined from vertical for proper specimen collection).

1.2.2 Gently insert the swab into the nostril parallel to the palate (not the curved nose along the bottom of the nasal cavity (there gently swab around the nostril).

1.2.3 When the tip of the swab reaches the posterior wall of the nasopharyngeal cavity, gently rotate it several times. (Collect as much secretion as possible).

1.2.4 To prevent reflex coughing, stop for one minute.

1.2.5 Slowly remove the swab.

1.2.6 Test the sample as soon as possible.

1.3 Nasal swab collection method

1.3.1 Tilt patient's head back 70 degrees.

1.3.2 Insert the swab into the nostril, about 1 inch (more or less) (about 2 cm) into nostril parallel to the palate and remain in nostril for a few seconds.

1.3.3 Rotate the swab several times against nasal wall. Remove swab, insert it in to the other nostril and repeat the procedure.

2. Sample treatment

2.1 Using the Positive Control/Negative Control:

2.1.1 Place the test sample in the tube, clip the cover to be in the tube and rotate 10-15 times, then break the stem at the swab, and leave the lower half in the treatment tube.

2.1.2 Covered the tube with cap, and then upside down 3 times.

2.2 Viral Transport Media

2.2.1 Proceed as with the treatment tube and open the treatment tube dropper.

2.2.2 Fill the tube with 350μL sample (VTM).

2.2.3 Add 3 drops of sample from tube (about 100 μL) to the sample well (S) of the test card.

Note: Centrifuge VTM at 8000 rpm for 5 minutes for the test

DETECTION METHOD

1.Before testing, read the operating instructions carefully , and remove the testing kit and reagents to room temperature (15-30°C) for 30 minutes.

2. Tear open the foil bag, take out the test card, and use it on a clean and smooth table. It is best.

3. Wait 1 minute for results to 5 minutes and sample treatment solution.

4. Vertically drop 3 drops (about 100 μL) of the treated sample solution into each of the three sample holes of the removed. Remove to add only 2 drops of the treated sample solution adding to avoid to or too little of the treated sample solution, and start timing. See the figure below.

5. The test card is not to be removed from the sealed bag until it is ready to be used.

Observation results read after 20minutes from the time of the sample being added to the test card are invalid.

NOTE: The test recommended should be done at 20~25℃.

INTERPRETATION OF RESULTS

1. Result of COVID-19 Antigen



2. Result of Influenza A/B



3. Result of RSV



- **Positive:** two red strips, both the detection line (T line) and the quality control line (C line) display clear red color.
- **Negative:** read strip, quality control line (C line) display color.
- **Invalid:** the quality control line (C line) is not red, or the observation window detected showing any colored lines, indicating that the test is invalid, so be retested with a new test card.

Note: Amounts observed SARS-CoV-2 Coronavirus Influenza/RSV positive results, negative control degree depends on the SARS-CoV-2 Coronavirus Influenza/RSV antigen in the sample.

Target 1 SARS-CoV-2 Antigen	Target 1 Influenza A	Target 1 Influenza B	Target 2 RSV	Interpretation
Negative	Negative	Negative	Negative	No target Antigen detected
Positive	Positive	Positive	Positive	SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A Antigen, Influenza B Antigen, RSV Antigen Detected

LIMITATION OF METHODOLOGY

1. This kit is a qualitative assay and is only used for in vitro auxiliary diagnosis.
2. Wild-type strain from the surface of Antigen detection reagent. the minimum detection limit (sensitivity analysis) is generally lower than the matrix and reagent. So, the researcher should pay attention to the negative result of the detection of low concentration samples. The negative result of this kit can not exclude infection, including nucleic acid tests are recommended for suspected negative results to avoid misdiagnosis.
3. Incorrect sampling, transportation, handling, and low virus content in samples may lead to false negative results.
4. The test results of this report are for clinical reference only and should not be used as the sole basis for clinical diagnosis and treatment. The final diagnosis of the disease should be based on a comprehensive assessment of all clinical symptoms and laboratory tests.

INDEX OF CHARACTERISTICS

1. Positive/negative coincidence rate: the positive coincidence coincidence rate of the enterprise should be ≥90%.
2. Negative coincidence rate: accurate not only rate: the negative coincidence product as allowable rate of the negative should be ≥99%.
3. Limit of detection: (LoD)
(1) The LoD of the Beijnsun SARS-CoV-2 & Influenza A/B&RSV Antigen Combo Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) is that confirmed by testing 20 replicates with concentrations at the limit of detection. The LoD of the SARS-CoV-2 Antigen is 0.5 TCID50/mL, the LoD of the Influenza A is 0.5 TCID50/mL, lowest concentration resulting in positive detection of twenty (20) out of twenty (20) replicates. Based on this testing the LoD formula were positive is confirmed as 95 %(19/20).

Influenza A	
Reference strain	Virus strains
S1	2009H1N1
S2	Seasonal H3N2
S3	H5N1(clade 2.3.4.4)

Influenza B	
Reference strain	Virus strains
S3	B/Victoria
S4	B/Yamagata

Note: Cross-reactivity of S1 to S4 is analysis for the test

DETECTION METHOD

1.Before testing, read the operating instructions carefully , and remove the testing kit and reagents to room temperature (15-30°C) for 30 minutes.

2. Tear open the foil bag, take out the test card, and use it on a clean and smooth table. It is best.

3. Wait 1 minute for results to 5 minutes and sample treatment solution.

4. Vertically drop 3 drops (about 100 μL) of the treated sample solution into each of the three sample holes of the removed. Remove to add only 2 drops of the treated sample solution adding to avoid to or too little of the treated sample solution, and start timing. See the figure below.

5. The test card is not to be removed from the sealed bag until it is ready to be used.

Observation results read after 20minutes from the time of the sample being added to the test card are invalid.

NOTE: The test recommended should be done at 20~25℃.

INTERPRETATION OF RESULTS

1. Result of COVID-19 Antigen

2. Result of Influenza A/B

3. Result of RSV

- **Positive:** two red strips, both the detection line (T line) and the quality control line (C line) display clear red color.
- **Negative:** read strip, quality control line (C line) display color.
- **Invalid:** the quality control line (C line) is not red, or the observation window detected showing any colored lines, indicating that the test is invalid, so be retested with a new test card.

Note: Amounts observed SARS-CoV-2 Coronavirus Influenza/RSV positive results, negative control degree depends on the SARS-CoV-2 Coronavirus Influenza/RSV antigen in the sample.

Target 1 SARS-CoV-2 Antigen	Target 1 Influenza A	Target 1 Influenza B	Target 2 RSV	Interpretation
Negative	Negative	Negative	Negative	No target Antigen detected
Positive	Positive	Positive	Positive	SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A Antigen, Influenza B Antigen, RSV Antigen Detected

INFORMACIÓN GENERAL

Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.
Room 1001 of Unit 2, Room 1001 and Room 1101 of Unit 1, Building 2, Hongshuang Technology Center, Zhenxing Community, Pusheng Sub-district, Longhua District, 518000 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-755-29503416 Fax: +86-755-81688111
Email:bzx@microprofit.com Site: http://www.microprofitbio.com

EC REP CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS, S.L.
C/ Horacio Lengo s/18-CP 29006 - Málaga - Spain

Fecha de revisión: 15.10.2024
Versión V2.1
Número de enseñanza: MKL SW-04UM-553

PL

fluorecare®

Zestaw Combo Antygenowe SARS-CoV-2 & Grypa A/B & RSV
(Chromatograficzny Test Immunologiczny z Użyciem Koloidalnego Złota)

NAZWA PRODUKTU

Nazwa Common: Zestaw Combo Antygenowe SARS-CoV-2 & Grypa A/B & RSV (Chromatograficzny Test Immunologiczny z Użyciem Koloidalnego Złota)
KOD PRODUKTU: MP-71
OPAKOWANIE: 25 sztuk/opakowanie

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Zestawu antygenowy zestaw w testowy Kwintuplet SARS-CoV-2, grypy A/B i RSV ma zastosowanie do jednoczesnego jakościowego wykrywania i różnicowania nowego Koronawirusa (antygen SARS-CoV-2), wirusa grypy A, wirusa grypy B, antygenu nukleo-SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z jamy ustnej gardła, wymazów z jamy nosowej lub wymazów z nosogardzieli od osób podejrzanych o COVID-19 przez pracownika służby zdrowia.

WPROWADZENIE

Nowe koronawirusy należą do grupy β. COVID-19 jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego. Ludzie są ogólnie podatni na działanie. Obecnie pacjenci zakażeni nowym koronawirusem są głównym źródłem infekcji. Osoby bezobjawowe mogą być również w pewnym stopniu zaraźliwe. Na podstawie aktualnego dochodzenia epidemiologicznego okres inkubacji wynosi od 1 do 14 dni, najczęściej od 3 do 7 dni. Główne objawy to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. W niektórych przypadkach stwierdza się objawy niedrożności nosa, katar, ból gardła, mialgię i biegunkę. Influenza (grypa) to ostrzejsza choroba układu oddechowego wywołana przez wirusy grypy. Istnieją dwa typy wirusów grypy, typy A i B. Oba typy wirusów grypy A i B powodują sezonowe epidemie przez cały okres jesienno-zimowy. Wirusy grypy A mogą zakazić innych przed, podczas i po wystąpieniu objawów. Wirus syncytialny oddechowy (RSV) jest otoczkowym, jednoniciowym wirusem RNA ujemnej otoczce, należącym do rodzaju wirusa. RSV jest główną przyczyną ostrego zakażenia dolnych dróg oddechowych u niemowląt. RSV jest rozpowszechniony na całym świecie, a większość dzieci ma zakażenie RSV przed ukończeniem pierwszego roku życia. Typowe objawy zakażenia RSV obejmują gorączkę, katar, kaszel i świszczący oddech. Wirus syncytialny oddechowy jest zwykle przenoszony drogą kropelkową i kontaktową, a ogólnie populacja jest podatna. Osoby powyżej 65 roku życia są podatne na RSV, ale czasami bardzo małe dzieci (zwłaszcza niemowlęta w wieku od 2 do 6 miesięcy) są bardzo wrażliwe na RSV, co często powoduje poważne choroby układu oddechowego, takie jak zapalenie oskrzelików i zapalenie płuc.

GŁÓWNE KOMPONENTY

Komponenty	Ilość	Główne składniki
Karta testowa (łącznie z osuszaczem)	25 kaset	Każda kaseta testowa składa się z plastikowej powłoki i pasków. Kaseta testowa służy do użytku tylko w połączeniu z SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A i Influenza B & RSV przeciwciało powlekane kolorowym złotem koloidalnym. Inne składniki obejmują podkładkę i dołączony osuszacz.
Roztwór do obróbki próbek	1 fiolka	Opcjonalnie (sterylny roztwór soli 5 ml, na probówkę)
Rurka do obróbki próbek z jednorazowym pipetą	25 fiolek	5 ml×50fiolek
Instrukcja użycia	1 egzemplarz	/
Sterylne wacik	25 szt.	/
Tubki ekstrakcyjne	25 szt.	/
Kontrola pozytywna	1 fiolka	Opcjonalnie: 2x SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A i Influenza B & RSV przeciwciało powlekane kolorowym złotem koloidalnym. 1 ml kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 białka, Influenza A i Influenza B, 0,5% konserwant.
Kontrola negatywna	1 fiolka	Opcjonalnie (sproszkowana ludzka krew, przygotowana z roztworu do obróbki próbek)

INFORMACJE OGÓLNE

Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.
Room 1001 of Unit 2, Room 1001 and Room 1101 of Unit 1, Building 2, Hongshuang Technology Center, Zhenxing Community, Pusheng Sub-district, Longhua District, 518000 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-755-29503416 Faks: +86-755-81688111
Email:bzx@microprofit.com Strona internetowa: www.microprofitbio.com

EC REP CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS, S.L.
C/ Horacio Lengo s/18-CP 29006 - Málaga - Spain

Data ostatniej rewizji: 15.10.2024
Wersja V2.1
Numer do nauczenia: MKL SW-04UM-555

1.2 Zbierz(wacik wsuń przez nozdrze do nosogardzieli, a następnie powoli z wewnątrz(Wacik musi być prostopadle do powierzchni twarzy, aby zapewnić prawidłowe pobranie próbki). Delikatnie pocieraj wacikiem wydzielin wydzielin wydzielin, aż poczujesz opór.(Upewnij się, że wacik dotyka nosogardzieli).

1.2.2 Pozostaw wacik na 15 sekund, jednocześnie obracając wacik kilka razy.

1.2.3 Powoli wyjmij wacik.

1.2.4 Włóż wacik do probówki z roztworem ekstrakcyjnym.

1.2.5 Obróć końcówkę wacika o 5 razy, przyciskając przez ścianę rurki.

1.2.6 Pozostaw wacik.

1.2.7 Dodaj 2 krople roztworu ekstrakcyjnego do próbki.

1.3 Wyjmij wacik.

1.3.1 Odchyl głowę pacjenta do tyłu o 70 stopni.

1.3.2 Włóż wacik do nozdrza, aż do osiągnięcia oporu (około 2 cm) i pozostaw na kilka sekund.

1.3.3 Obracaj wacikiem kilka razy o ścianę nozdrza. Wyjmij wacik, włóż go do drugiego nozdrza i powtórz procedurę.

2.Obróbka próbek

2.1 Użycie roztworu kontrolnego/roztworu kontrolnego negatywnego:

2.1.1 Umieść próbkę w probówce, zamknij probówkę i odwróć ją 10 razy, a następnie przełam go w wacik w tej kolejności, aby płyn zostaw pozostała w probówce do obróbki.

2.1.2 Zamknij probówkę i odwróć ją do góry nogami 3 razy.

2.2 Wirusowy roztwór transportowy

2.2.1 Postępuj zgodnie z roztworem do obróbki i otwórz pipetę roztworu do obróbki.

2.2.2 Napełnij probówkę 350 μl próbki.

2.2.3 Dodaj 3 krople próbki z probówki (około 100 μl) do studzienki próbki (S) kasety testowej.

Uwaga: Probówkę, wraz z VTM należy odwirować przy 8000 obr./min przez 5 minut przed testem.

METODA OCENY

1.Przed przystąpieniem do badania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, a przed użyciem przywrócić zestaw testowy i odczynniki do temperatury pokojowej (20-25°C).

2.Rozerwij foliową torebkę, wyjmij kartę testową i połóż ją na czystym, równym stole. Najlepiej.

3.Poczekaj 1 minutę na wyniki i 5 minut na próbkę i roztwór do obróbki próbki.

4.Upuść 3 kropla (około 100 μl) przetworzonej próbki do każdej z trzech studzienek na próbkę usuniętej karty. Nie dodawaj za dużo ani za mało próbki, ponieważ może to wpłynąć na wynik. Rozpocznij pomiar czasu. Patrz poniższy rysunek.

5.Karta testowa powinna pozostać w zapieczętowanej foliowej torebce do momentu użycia.

Wyniki należy odczytać po 20 minutach od momentu dodania próbki do karty testowej. Wyniki odczytane po 20 minutach są nieważne.

Uwaga: Zaleca się wykonanie badania w temperaturze 20~25℃.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

1. Wynik antygenu COVID-19

2. Wynik grypy A/B

3. Wynik RSV

- **Pozytywny:** dwa czerwone paski, zarówno linia detekcji (linia T) jak i linia kontroli jakości (linia C) wyraźnie widoczne.
- **Negatywny:** tylko pasek kontroli jakości (Linia C) jest obserwowany kolorowy.
- **Nieważny:** Pomyślnie linia kontroli jakości (Linia C) nie jest obserwowana kolorowy, ponieważ wynik jest nieważny. Należy ponownie przeprowadzić test z użyciem nowej karty testowej.

Uwaga: Obserwowane wyniki pozytywne SARS-CoV-2 Koronawirus Influenza/RSV, kontrola negatywna stopień zależy od ilości antygenu SARS-CoV-2 Koronawirus Influenza/RSV w próbce.

Target 1 SARS-CoV-2 Antigen	Target 1 Influenza A	Target 1 Influenza B	Target 2 RSV	Interpretacja
Negatywny	Negatywny	Negatywny	Negatywny	Nie wykryto antygenu
Pozytywny	Pozytywny	Pozytywny	Pozytywny	Wykryto antygen SARS-CoV-2, antygen grypy A, antygen grypy B, antygen RSV

OGRANICZENIE METODOLOGII

1. Zestaw ten jest testem jakościowym i służy wyłącznie do diagnostyki pomocniczej in vitro.
2. Dla wyjaśnienia ogólnowirusy wykrywający próbka do wykrywania antygenu, minimalna granica wykrywania (analiza ilościowa) jest ogólnie niższa niż odczynnika do wykrywania kwasu nukleinowego i matrycy. Dlatego badacz powinien zwrócić uwagę na wynik ujemny próbek o niskim stężeniu. Ujemny wynik tego zestawu nie może wykluczyć infekcji, w tym kwasu nukleinowego zaleca się testy w celu uniknięcia błędnej diagnozy.
3. Nieprawidłowe pobieranie próbek, transport, przechowywanie i inne czynniki mogą skutkować wynikami fałszywie ujemnymi lub niskim poziomem wirusa w próbce.
4. Wyniki testów w tym raporcie są tylko do celów referencyjnych klinicznych. Ostateczna diagnoza choroby powinna być oparta na kompleksowej ocenie wszystkich objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.

ANWENDUNGSZWECK

Der Beijnsun SARS-CoV-2 & Influenza A/B- & RSV-Antigen-Kombi-Test ist für den gleichzeitigen qualitativen Nachweis und die Differenzierung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2-Antigen), des Influenza-A-Virus, des Influenza-B-Virus, des Nukleo-SARS-CoV-2-Antigens in Proben von Rachenabstrichen, Nasenabstrichen oder Nasopharyngealabstrichen von Personen, die von medizinischem Fachpersonal als COVID-19-verdächtig eingestuft wurden.

EINFÜHRUNG

Die neuen Coronaviren gehören zur Gattung β. COVID-19 ist eine akute Atemwegsinfektionskrankheit. Menschen sind im Allgemeinen anfällig. Derzeit sind die mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienten die Hauptinfektionsquelle. Auch asymptomatisch Infizierte können in gewissem Maße ansteckend sein. Nach der aktuellen epidemiologischen Untersuchung beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meistens 3 bis 7 Tage. Zu den Hauptsymptomen gehören Fieber, Müdigkeit und Reizhusten. In einigen Fällen wurden auch Symptome wie verstopfte Nase, laufende Nase, Halsschmerzen, Myalgien und Durchfall gefunden. Influenzaviren verursachen normalerweise leichte bis mittelschwere Krankheiten. Schwere Symptome der Grippe können zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen. Hohe Risiken, wie kleine Menschen, ältere Menschen, Menschen mit zugrunde liegenden Gesundheitsproblemen und einem höheren Risiko für schwere Grippekomplikationen. Es gibt zwei Hauptarten von Influenzaviren, Typ A und B. Sowohl Influenza-A- als auch Typ-B-Viren sind regelmäßig unter Menschen mit saisonalen Epidemien jeden Winter verbreitet. Influenza-A-Viren können sich auf andere ausbreiten, bevor eine Person Anzeichen und Symptome einer Krankheit zeigt.

Das neuartige Respiratorische (RSV) ist ein mit einer hüllen, einzelsträngigen RNA-Virus mit negativer Strang-Hülle, RSV ist in eine Gattung des Virus verbreitet, sind die Hauptursache für akute Atemwegsinfektionen der unteren Atemwege bei Kindern. Die meisten RSV-Infektionen in der Welt wurden bei Kindern unter 2 Jahren gemeldet. Typische Symptome einer RSV-Infektion sind Fieber, laufende Nase, Husten und Keuchen. Respiratorische Synzytialviren werden normalerweise durch Tröpfchen und Kontakt übertragen, und die Bevölkerung ist im Allgemeinen anfällig. Menschen über 65 Jahren sind anfällig für RSV, aber manchmal sind sehr kleine Kinder (insbesondere Säuglinge im Alter von 2 bis 6 Monaten) sehr empfindlich gegenüber RSV, was oft zu schweren Atemwegserkrankungen wie Bronchiolitis und Lungenentzündung führt.

PRINZIP

Der SARS-CoV-2- und Influenza-A/B- und RSV-Antigen wird in Rachen-, Nasen- oder Nasenrachenabstrichen von Menschen mit Hilfe der Kolloidgold-Methode qualitativ nachgewiesen. Nach dem Hinzufügen der Probe reagiert das SARS-CoV-2-Antigen (oder Influenza A/B & RSV) in der zu testenden Probe mit dem SARS-CoV-2-Antigen (oder Influenza A/B & RSV) Antikörper-Kolloidgold-Konjugat, um einen Komplex zu bilden. Das Gemisch wandert dann durch Kapillarwirkung und interagiert mit dem SARS-CoV-2-Antigen (oder Influenza A/B & RSV) Antikörper-Kolloidgold-Komplex. Bei der Chromatographie wird das SARS-CoV-2-Antigen (oder Influenza A/B & RSV) Antikörper-Kolloidgold-Konjugat durch den SARS-CoV-2-Antigen (oder Influenza A/B & RSV) Antikörper im Testlinienbereich eingefangen. Der Antikörper/Antigen oder bindet an eine farbige Einheit (rot), wodurch der Bereich ein positives Ergebnis anzeigt. Kolloidgold-markiertes SARS-CoV-2-Antigen (oder Influenza A/B & RSV) Antikörper diffundiert in den Qualitätskontrollinienbereich (C) und wird durch Anti-Maus-IgG eingefangen. Nach Abschluss der Reaktion können die Ergebnisse durch visuelle Beobachtung interpretiert werden.

HAUPTKOMPONENTEN

Komponenten	Menge	Hauptkomponenten
Testkarte (einschließlich Trockenmittel)	25 Kassetten	Jede Testkarte besteht individuell aus einer Kunststoffhülle und Streifen. Die Testkarte ist nur zur Verwendung in Verbindung mit SARS-CoV-2-Antigen, Influenza A und Influenza B & RSV Antikörper beschichtet, bei denen kolloidales Gold verwendet wird. Andere Komponenten sind Pad und das getrocknete Trockenmittelpad.
Verarbeitungslösung für Probenbehandlungslösung	1 Schlauch	5 ml×50schläuche
Verwendungsanweisungen	1 Exemplar	/
Sterile Tupfer	25 Stück	/
Testschlauchsatz	25 Stück	/
Positivkontrolle	1 Schlauch	Optional: 2x SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A und Influenza B & RSV Antikörper beschichtet mit kolloidalem Gold. 1 ml Nukleinsäure SARS-CoV-2-Protein, Influenza A und Influenza B-Protein, 0,5% Konservierungsmittel.
Negativkontrolle	1 Schlauch	Optional (ein SARS-CoV-2-Antigen, Influenza A und Influenza B & RSV Antikörper beschichtet mit kolloidalem Gold. 1 ml Nukleinsäure SARS-CoV-2-Protein, Influenza A und Influenza B-Protein, 0,5% Konservierungsmittel.)

ERFORDERLICHE, ABER NICHT BEREITGESTELLTE MATERIALIEN

- Timer
- Formaldehydsäure oder Virkl Transport Media., there is a need for a plastic transfer pipette (or a reusable sample collected by or other) for sample to transfer the measured volume to the extraction tube.
- The components listed above are for use with the kit of the same batch, and their components in the kit of different batches should not be mixed together.

LAGERBEDINGUNGEN UND VERFALLSDATUM

Lagern Sie das Testkit bei 2-30 °C an einem trockenen Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei 2-8 °C einfrieren. Testkits sind 24 Monate ab Herstellungsdatum gültig. Verwenden Sie das Testkit innerhalb einer Stunde, wenn der Beutel geöffnet wird.

ANFORDERUNGEN AN PROBEN

1. Probenahme

1.1 Methode zur Entnahme von Rachenabstrich

1.1.1 Den Kopf des Patienten leicht kippen.

1.1.2 Verwenden Sie einen sterilen Tupfer, um den Oropharynx oder die Rachenmandeln auf beiden Seiten abzuwischen, wobei darauf zu achten ist, dass die Zunge oder das Zahnfleisch nicht berührt werden.

1.1.3 Den Zungengrund des Patienten mit einem Tupfer abwischen.

1.1.4 Die Rachenmandeln und beide Seiten des Rachens mindestens 2 Mal hin und her reiben.

1.1.5 Die Proben schnell wie möglich testen.

1.2 Methode zur Entnahme von Nasen-Rachen-Abstrich

1.2.1 Den Kopf des Patienten nach hinten neigen und die Probe aus dem Nasenloch entnehmen, die dem Nasenrachenraum am nächsten liegt (der Kopf sollte für eine korrekte Probenentnahme nach hinten geneigt sein).

1.2.2 Den Tupfer durch die Nasenöffnung einführen und dann langsam am Rachendach vorbeiführen, bis der Tupfer parallel zum Gaumen ist (nicht in Richtung Nasenboden bewegen).

1.2.3 Wenn die Tupferspitze die hintere Rachenwand erreicht, den Tupfer mehrmals drehen, um möglichst viel Sekret aufzunehmen (möglichst viel Sekret entnehmen).

1.2.4 Um Hustenreflexe zu vermeiden, eine Minute pausieren.

1.2.5 Den Tupfer langsam herausziehen.

1.2.6 Die Probe so schnell wie möglich testen.

1.3 Methode zur Entnahme von Nasenabstrich

1.3.1 Den Kopf des Patienten um 70 Grad nach hinten neigen.

1.3.2 Den Tupfer etwa 2 cm (mehr oder weniger) in das Nasenloch einführen, das etwa parallel zum Gaumen verläuft, und ihn einige Sekunden dort belassen.

1.3.3 Den Nasentupfer mehrmals an der Nasenwand drehen. Den Tupfer herausnehmen, in das andere Nasenloch einführen und den Vorgang wiederholen.

2. Probenbehandlung

2.1 Verfahren mit Positiv-/Negativkontrolle:

2.1.1 Die Probe in das Röhrchen für die Probenbehandlung geben, den Deckel wieder aufsetzen und den Stiel des Tupfers abbrechen, so dass der untere Teil des Tupfers im Röhrchen für die Probenbehandlung verbleibt.

2.1.2 Das Röhrchen mit dem Deckel verschließen, das Röhrchen dreimal auf den Kopf stellen.

2.2 Virus-Transportmedium (VTM):

2.2.1 Die Probenbehandlungslösung wie vorbereitet und die Einpflanzlösung der Probenbehandlungslösung öffnen.

2.2.2 350 μL Probe (VTM) in das Röhrchen geben.

2.2.3 Drei Tropfen Probe aus dem Röhrchen (etwa 100 μL) in das Probenloch (S) der Testkarte geben.

Hinweis: Zentrifugieren Sie das mit VTM für den Test gesammelte Röhrchen bei 8000 U/min für 5 Minuten.

NACHWEISMETHODE

1. Vor dem Testen die Testkartenverpackung und die Reagenzien auf Raumtemperatur (15-30 °C) bringen.

2. Reißen Sie den Folienbeutel auf, nehmen Sie die Testkarte heraus und legen Sie sie auf einen sauberen, ebenen Tisch. Am besten.

3. Warten Sie 1 Minute auf das Ergebnis und 5 Minuten auf die Probenbehandlungslösung.

4. Geben Sie 3 Tropfen (ca. 100 μl) der behandelten Probe in jedes der drei Probenlöcher der entfernten Testkarte. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel oder zu wenig von der behandelten Probe hinzufügen, und starten Sie den Timer. Siehe die Abbildung unten.

5. Die Testkarte sollte erst aus dem versiegelten Beutel entnommen werden, wenn sie verwendet werden soll.

Die Ergebnisse sollten 20 Minuten nach Zugabe der Probe zur Testkarte abgelesen werden. Ergebnisse, die nach 20 Minuten abgelesen werden, sind ungültig.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Test bei 20~25 °C durchzuführen.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

1. Ergebnis von COVID-19 Antigen

2. Ergebnis von Influenza A/B

3. RSV-Ergebnis

- **Positiv:** Zwei rote Streifen, sowohl die Nachweislinie (T-Linie) als auch die Qualitätskontrolllinie (C-Linie) zeigen Farbe.
- **Negativ:** Nur ein roter Streifen, die Kontrollinie (C-Linie) weist Farbe.
- **Ungültig:** Position der Kontrollinie (Linie C) ist Nachweiser eingefärbte Farbe. Der Testlauf ungültig und die Probe sollte mit einem neuen Testkit erneut getestet werden.

Hinweis: Beobachtete positive SARS-CoV-2 Coronavirus / Influenza / RSV-Ergebnisse, negative Kontrolle Grad hängt von der Menge des SARS-CoV-2 Coronavirus / Influenza / RSV-Antigens in der