

Promanum® pure

Händedesinfektion mit speziellem Rückfettersystem

EIGENSCHAFTEN

- Händedesinfektionsmittel mit ausgesuchten Rückfettern
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Dermatologisch getestet

DGHM-/VAH-, RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



WIRKSPEKTRUM / EINWIRKZEITEN

EINSATZGEBIET	NORM	EZ	LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
hygienische Händedesinfektion	EN 1500	30 Sek.	100 ml-Flasche	20	19591	08815842
chirurgische Händedesinfektion	EN 12791	90 Sek.	500 ml-Spenderflasche	20	19592	08815948
bakterizid	EN 13727	15 Sek.	500 ml-Spenderflasche	20	19751	11139729
MRSA	EN 13727	15 Sek.	mit aufgesetzter Dosierpumpe			
levurozid	EN 13624	15 Sek.	1000 ml Spenderflasche	10	19593	08815977
tuberkulozid**	EN 14348	15 Sek.	1000 ml Spenderflasche	10	19752	11139712
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	DVV/RKI	15 Sek.	mit aufgesetzter Dosierpumpe			
begrenzt viruzid PLUS, gemäß DVV	DVV/RKI	30 Sek.				
Rotaviren	DVV/RKI	15 Sek.				
Noroviren***	DVV/RKI	15 Sek.				
Adenoviren	DVV/RKI	30 Sek.				
			5 Liter-Kanister	1	19594	08816008

** Nach Vorgabe des RKI soll bei der Kontamination mit Mykobakterien die hygienische Händedesinfektion 2-mal durchgeführt werden.

*** Surrogatvirus MNV

Promanum® pure

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 73,4 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Butan-2-on, Sorbitol (Ph. Eur.), (Hexadecyl,octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Povidon K 30. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung.

Warnhinweise: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung.

14 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

Stand der Information: 03/2012

Pharmazeutischer Unternehmer: B.Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen