

schülke -+

Zur Vermeidung einer Verwechslung von octeniderm® farblos mit anderen farblosen Flüssigkeiten empfiehlt schülke folgendes Vorgehen:



octeniderm® farblos



Befüllen Sie eine Schale mit Tupfern.



Füllen Sie octeniderm® farblos nur in ein Gefäß, in dem sich bereits Tupfer befinden.

Andere farblose Flüssigkeit



Stellen Sie eine leere Schale bereit.



Füllen Sie die farblose Flüssigkeit in die leere Schale ein.



■ octeniderm® farblos – alkoholisches Hautantiseptikum mit Remanenzeffekt.

Konzentration auf das Wesentliche. Hervorragende Wirkung
und langer Schutz mit einer Remanenzwirkung von
mindestens 48 Stunden bei sehr schnellem Wirkungseintritt.



octeniderm® farblos

Gebrauchsfertiges, alkoholisches, remanentes Hautantiseptikum

■ Unser Plus

- mindestens 48 Stunden Remanenzwirkung
- insb. zur Anwendung vor invasiven Eingriffen
mit einem hohen Infektionsrisiko
- breites antiseptisches Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid,
begrenzt viruzid** (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes-simplex-Viren)
- schneller Wirkungseintritt



Gebindegröße

Karton mit 10 x 250 ml-Flasche	118211
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	118212

Zubehör

Sprühkopf für 500 ml / 1 l-Flasche	180212
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche	134416

** gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

octeniderm® farblos: Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, 1-Propanol (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 30,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.). Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien sowie zur Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzem) sind möglich. Stand 09/20

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH · 22840 Norderstedt · Tel: +49 40 52100-666 · info@schuelke.com

schülke -+

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 52100-0 | -318
www.schuelke.com



[youtube.com/schuelkeChannel](https://www.youtube.com/schuelkeChannel)



[facebook.com/myschulke](https://www.facebook.com/myschulke)

901128 | III | 01.2021 | B | westwerk
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

01.07.20