

HOLTSCH MED

Qualität. Sicherheit. Vertrauen.

Quickpad

Unser als Arzneimittel zugelassenes Spendersystem für gebrauchsfertige Alkoholtupfer.

Quickpad eignet sich mit dem Wirkstoff 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V) sehr gut zur Vorbereitung der Haut, z.B. einer Punktion oder vor Injektionen und Blutentnahmen. Quickpad ist auch geeignet für die regelmäßige Anwendung zu Hause, z.B. für Diabetiker. Der Tuferspender ist komplett verschweißt und sterilisiert, der Deckel schließt hermetisch ab, wodurch bei fachgerechtem Gebrauch Feuchtigkeit und Sterilität bis zum letzten Tupfer erhalten bleiben.

Holtsch
Medizinprodukte GmbH
In den Faltern 13
D-65232 Taunusstein

T +49 6128 91717-7
F +49 6128 44742
M info@holtsch-med.com
W holtsch-med.com



PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953

Der Behälter enthält 150 gebrauchsfertige Tupfer im Format 44 x 44 mm und erfordert nur geringen Platzbedarf im täglichen Einsatz und in der Lagerhaltung.

Made in Germany

Quickpad
Wirkstoff: 2-Propanol (Ph. Eur.)
70% (V/V) Getränkte Tupfer
zur Anwendung auf der Haut
für Säuglinge, Kinder und Erwachsene

Stoff- oder Indikationsgruppe:
Desinfektionsmittel/
Antiseptikum

Anwendungsgebiete:
Zur Desinfektion der Haut vor
Injektionen.

Gegenanzeigen:
Nicht anwenden:
- bei Überempfindlichkeit gegen
2-Propanol (Isopropylalkohol)
- zur Hautdesinfektion vor
Eingriffen die eine größere
Eröffnung erfordern als eine
Injektion
- zur Antiseptik offener Wunden
- zur Schleimhautantiseptik,
insbesondere am Auge
- zur Hautdesinfektion bei
Frühgeborenen.

**Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung:**
Keine Anwendung auf Schleim-
häuten, insbesondere dem Auge

**Was müssen Sie in Schwanger-
schaft und Stillzeit beachten?**
Bei sachgemäßem Gebrauch
kann Quickpad während der
Schwangerschaft und Stillzeit
verwendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen
Mitteln:** Keine bekannt.

**Dosierungsanleitung und Art
der Anwendung:** Zur Desinfek-
tion/Antiseptik die betroffene
Hautfläche mit QUICKPAD
abreiben und trocknen lassen.
Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s
einzuhalten.

Nebenwirkungen: Bei Hautein-
reibungen mit 2-Propanol
(Ph.Eur.) 70 % (V/V) können in
sehr seltenen Fällen (dies ent-
spricht weniger als 1 von 10.000
Behandelten) Hautrötungen und
leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen:
Wenn Sie Nebenwirkungen
bemerken, wenden Sie sich an
Ihren Arzt oder Apotheker oder
medizinisches Fachpersonal.
Dies gilt auch für Neben-
wirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben
sind. Sie können Nebenwirkun-
gen auch direkt dem
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte,
Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
D-53175 Bonn,
Website: www.bfarm.de
anzeigen. In dem Sie Neben-
wirkungen melden, können
Sie dazu beitragen, dass mehr
Informationen über die Sicher-
heit dieses Arzneimittels zur
Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Halt-
barkeit des Arzneimittels:** Das
Verfallsdatum dieser Packung
ist auf dem Kunststoffbehältnis
angegeben. Verwenden Sie
diese Packung nicht mehr nach
diesem Datum! Haltbarkeit nach
Anbruch: 6 Monate.

Lagerungshinweise: Vor Feuer
schützen! Gut verschlossen
aufbewahren. Arzneimittel
für Kinder unzugänglich
aufbewahren. Letzten Tupfer
nicht aufbewahren, mögliches
Eintrocknen.

Zusammensetzung:
1 Kunststoffbehältnis mit 150
getränkten Tupfern enthält pro
Tupfer: Arzneilich wirksamer
Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.)
70% (V/V); 0,41 g
Sonstige Bestandteile: Vliestup-
fer aus Polypropylen; 0,12 g

Packungsgrößen: Packung mit
150 getränkten Tupfern.

**Pharmazeutischer Unternehmer
und Hersteller:** HOLTSCH
Medizinprodukte GmbH
In den Faltern 13
D-65232 Taunusstein
Telefon: (06128) 917177
Telefax: (06128) 44742

Stand der Information:
Februar 2018
Zul.-Nr.: 51196.00.00