Histoacryl®

Erprobt, bewährt, zuverlässig

Gewebekleber aus n-Butyl-2-Cyanoacrylat





Biosurgicals

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Histoacryl®

Erprobt, bewährt, zuverlässig

Erprobt und bewährt

Mehr als 2000 Publikationen belegen die erfolgreiche Anwendung von Histoacryl®.

Eigenschaften

Lagerung bei Raumtemperatur

- Exzellente kosmetische Ergebnisse [1]
- Einfaches, schnelles und präzises Auftragen
- Sterile Ampulle für den OP-Einsatz hervorragend geeignet
- Blau eingefärbt
- Antibakterieller Schutzfilm gegen Eindringen von Bakterien [2]
- Wundverbände sowie Lokalanästhesie nicht erforderlich
- Einlagiges Auftragen ausreichend
- Duschbeständig

Indikation Hautverschluss

Histoacryl® – die ideale Alternative zur gewohnten Naht

Indiziert für oberflächliche Hautwunden und -schnitte, im Speziellen:

- Platzwunden bei Kindern
- Notaufnahme

Histoacryl® – zum Verschluss von laparoskopischen Inzisionen [3]

Durch die Sterilität der Ampulle ist der Gewebekleber Histoacryl® hervorragend für den OP-Einsatz geeignet.



Applikation Hautverschluss



Öffnen der Peel Verpackung



Reinigung der Wunde

Abdrehen der Ampullenspitze



Adaptierung der Wundränder



Dünnschichtige Applikation von Histoacryl®



Halten der Wundränder für ca. 1 Minute

1) Amiel GE et al., J Am Coll Surg 1999; 189: 21-5
2) Wilkinson JN et al., Anaesthesia 2008; 63: 1382-4
3) Rosin D et al., J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2001 Jun; 11: 157-9

Indikation Sklerosierungstherapie

Sklerosierungstherapie großer Ösophagus- und Fundusvarizen

Ösophagus- und Fundusvarizen sind meist durch eine portale Hypertension bedingt. Variköse Blutungen stellen eine lebensbedrohliche Komplikation dar und sind ein medizinischer Notfall.



Sklerosierung mit Histoacryl®[4,5]

- Anwendung sowohl für blutende als auch für nicht blutende Varizen
- Kombinierte Therapie von Histoacryl® und konventioneller Sklerosierungstherapie möglich[6]
- Blutstillung wird in 93 % – 100 % der Fälle berichtet[7]
- Niedrigere Nachblutungsrate im Vergleich zur Bandligatur[8]

Applikation Sklerosierungstherapie



Aufziehen von Röntgenkontrastmittel in die Spritze



Aufziehen von Histoacryl® in die Spritze im Verhältnis 1:1



Behutsame Vermischung beider Komponenten und einführen in die Sklerosierungsnadel



Punktierung der Varize und Injektion der Mischung



Obliteration der Varize und Blutstillung

Ausscheiden des gebildeten Histoacryl® Abguss durch den Verdauungstrakt

4) Ameis D et al., Notfall & Rettungsmedizin 2004; 7: 85-91
5) Seewald S et al., Gastrointest Endosc. 2008; 68: 447-54
6) Feretis C et al., Endoscopy 1995; 27: 355-7
7) Binmoeller KF et al., Endoscopy 1995; 27: 392-6
8) Tan PC et al., Hepatology 2006; 43: 690-7

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nr.	PZN
5 x 0,5 ml	blau	9381104	4929052

B. Braun Melsungen AG | OPM | 34212 Melsungen | Deutschland
Tel (0 56 61) 71-62 63 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de

W.03.07.11/1 Nr. 9997777 Stand: 07/2011